

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne


 Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

 62, avenue Nationale - La Neuville
 B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
 Téléphone : (26) 09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Abonnement annuel : F

Régisseur de Recettes D D A Marne

C.C.P. Châlons-sur-Marne 2800-67 W

ÉDITION SPÉCIALISÉE - GRANDES CULTURES**BULLETIN N° 5 du 14 février 1985**

Envoi n° 4

ABONNEMENT ANNUEL :

EDITION A ou B : 125 F

EDITION A + B : 225 F

- TOUTES CULTURES** : la première vague de froid n'a pas provoqué de dégâts sérieux.
- CEREALES** : prudence avec les herbicides à action racinaire.
- COLZA** : la Cylandrosporiose progresse localement.

CEREALES

GEL : les observations réalisées en culture depuis fin janvier confirment l'absence presque totale de dégâts de gel physiologique. Seuls quelques semis tardifs, mal implantés, ont souffert du froid.

Les dégâts de gel mécanique sont moins rares mais restent le plus souvent faibles (5 à 10 % de pieds sectionnés).

COMPTE TENU DE LA NOUVELLE VAGUE DE FROID :

Un nouveau point devra être fait après le dégel pour l'ensemble des semis, notamment dans les parcelles mal enracinées en secteurs sensibles au déchaussement.

DESHERBAGE : PRUDENCE

Attention aux produits racinaires (isoproturon) sur les cultures ayant souffert du froid.

N'intervenez que sur :

- *céréales au stade 4 feuilles.*
- *vulpins levés.*
- *plantes bien enracinées.*

ATTENTION aux mélanges avec les engrais liquides dans les parcelles ayant souffert du froid.

Consultez votre technicien habituel en cas de doute.

COLZA

GEL : les dégâts sont très limités. Seuls les pieds les moins développés ont souffert dans

les situations où la neige était absente les 4 et 5 janvier.

CYLINDROSPORIOSE

Situation : des symptômes de cylindrosporiose sont visibles :

- dans l'Aube (secteur de Magny-Fouchard, de Bar/Seine...)
- dans la Marne (Perthois)
- en Haute-Marne (secteurs de Wassy, Joinville, Blaiserville)

Dans ces situations, certaines parcelles présentent une proportion assez importante de feuilles jeunes touchées.

Préconisations :

Les résultats d'essais conduits en 1984 permettent de tirer les conclusions suivantes :

- les interventions précoces (début d'élongation de la tige) sont les plus efficaces.
- le Sportak PF a une efficacité généralement supérieure aux BMC, bien que cela ne se traduise pas par une augmentation de rendement.

En conséquence :

Assurez-vous de la présence ou non de cylindrosporiose dans votre parcelle avant de prendre toute décision. Les points blancs (acervules) caractéristiques de la maladie apparaissent en 1 à 2 jours sur des feuilles mises en sac plastique (bulletin n° 2 du 13/12/84).

.../...

** En cas de forte présence de la maladie et surtout si les feuilles les plus jeunes sont touchées, une intervention pourra être envisagée dès que la température le permettra.*

Un traitement plus tardif risquerait de se révéler moins efficace.

Préférez le Sportak PF à 1,5 l au carbendazime à 500 g de matière active.

** Dans les autres situations, une nouvelle visite des parcelles sera à réaliser juste avant le redémarrage de la végétation.*

PRODUITS DE TRAITEMENTS EN STOCK

Les spécialités phytosanitaires (surtout les liquides) stockées dans des locaux non chauffés ont pu être détériorées par le froid. Vérifiez leur état (homogénéité, dégâts) et renseignez-vous sur leur résistance au gel auprès des fournisseurs ou des firmes concernées.

REABONNEMENT AUX BULLETINS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Vous n'êtes pas encore réabonnés à l'édition "Grandes Cultures" ?

Il est encore temps de le faire ! Pour 125,00 F, vous profiterez d'une information phytosanitaire, complète et concrète, à partir d'observations faites sur le terrain.